

DIAGNOSTIEK & BEHANDELING ERNSTIGE SEPSIS!

Diagnostiek Zo snel mogelijk!

Bloedafname:

- ✓ SEPSIS pakket
- ✓ 2 bloedkweken voor toediening antibiotica!

Standaard onderzoek:

- ✓ Monitoring vitale functies
- ✓ X-thorax
- ✓ Urinesediment en kweek

Afhankelijk van de focus aanvullende kweken afnemen

- ✓ Sputumkweek
- ✓ Faeceskweek
- ✓ Wondkweek
- ✓ Liquor
- ✓ Anders ...

Behandeling Binnen 1 uur na triage SEH!

- ✓ Dien 15 ltr zuurstof toe via nonbreathingmasker
Streefwaarde: afbouwen tot max 6L O2 waarbij sat >90%
- ✓ Dien direct na afname kweken breedspectrum antibiotica i.v. toe
- ✓ Indien een MAP < 65 mmHg of een syst. < 90 mmHg of daling > 40 mmHg van de uitgangsbloeddruk dien een bolus van 20 ml/kg NaCl 0,9% toe in max. 30 min. en herhaal zonodig
Streefwaarde: syst > 90 mmHg, MAP > 65 mmHg
- ✓ Breng een urinecatheter in en meet de diurese
Streefwaarde: 0,5ml/kg/uur

Indien de bloeddruk niet reageert op vulling, neem contact op met intensivist en start met vasopressoren of plaats patient over naar IC

**Bij elke ernstige sepsis of septische shock
neem contact op met intensivist!**